

# Evaluation de l'acquisition de connaissances

Personnes âgées : le bon médicament  
réduit les risque iatrogénique

Nom :

Nom de la Pharmacie :

Date :

Votre participation à cette autoévaluation vous aidera à situer l'état de vos pratiques actuelles ainsi que celles précédentes au sein de votre équipe. Cela nous permettra de mieux identifier vos besoins et d'orienter efficacement votre apprentissage lors de la formation. Le résultat de cette autoévaluation pourra être comparé dans le temps avec d'évaluer votre progression.

Nous vous invitons à vous munir de ce document complété le jour de la formation.

## Mes connaissances du sujet

**Quand devient-on une personne âgée ? (au maximum 2 coches)**

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> âge > 65 ans (0) | <input type="checkbox"/> âge > 65 ans + polypathologie (1) |
| <input type="checkbox"/> âge > 75 ans (1) | <input type="checkbox"/> âge > 75 ans + polypathologie (0) |
| <input type="checkbox"/> âge > 85 ans (0) | <input type="checkbox"/> âge > 85 ans + polypathologie (0) |

**Nommer 4 facteurs majeurs d'hospitalisation des personnes âgées :**

.....  
.....  
.....  
.....

**Classer les médicaments de la personne âgée par ordre de fréquence décroissante de prescription :**

- appareil cardiovasculaire
- système nerveux central et antalgiques
- appareil digestif
- appareil locomoteur
- psychotropes

Les effets indésirables médicamenteux chez >65 ans par rapport à <45 ans sont : (1 seule réponse possible à la 1<sup>ère</sup> question)

- moins nombreux (0)     pareil (0)     plus nombreux (1)

dans quelle proportion (0 ou 1 si x2) .....

L'iatrogénie médicamenteuse désigne les effets indésirables provoqués par les médicaments :

- elle correspond aux effets secondaires connus des médicaments :

- d'accord (3)     plutôt d'accord (2)  
 plutôt pas d'accord (0)     pas d'accord (0)

- elle correspond à des erreurs humaines (médicament mal prescrit, mal délivré, mal pris ou mal suivi) :

- d'accord (3)     plutôt d'accord (2)  
 plutôt pas d'accord (0)     pas d'accord (0)

Les effets indésirables médicamenteux sont évitables :

(1 seule réponse possible)

- en aucun cas (0)  
 dans 1/3 des cas (1)  
 dans 1/2 des cas (2)  
 dans 2/3 des cas (2)

- dans 100% des cas (0)

Les erreurs d'observance concernent 40 à 60% des personnes âgées : (1 seule réponse possible)

- d'accord (3)     plutôt d'accord (2)  
 plutôt pas d'accord (0)     pas d'accord (0)

## Ma Pratique Officinale

Pour une dispensation de médicaments pour une personne âgée, je connais les spécificités de la prescription médicamenteuse chez le sujet âgé : (1 seule réponse possible)

- Cela fait partie de ma pratique officinale (2)  
 Cela ne fait pas partie de ma pratique officinale, mais je dispose des savoir-faire nécessaires (1)  
 Cela ne fait pas partie de ma pratique officinale, et je **ne** dispose **pas** des savoir-faire nécessaires (0)  
 Non concerné (N)

Je sais comment réduire l'iatrogénie médicamenteuse chez le sujet âgé : (1 seule réponse possible)

- Cela fait partie de ma pratique officinale (2)  
 Cela ne fait pas partie de ma pratique officinale, mais je dispose des savoir-faire nécessaires (1)  
 Cela ne fait pas partie de ma pratique officinale, et je **ne** dispose **pas** des savoir-faire nécessaires (0)

Non concerné (N)

Quantifiez votre aptitude à lutter contre l'iatrogénie médicamenteuse d'une prescription chez le sujet âgé (en vous situant sur l'échelle ci-dessous, de 0 = aucune connaissance ni organisation à 10 = excellentes connaissances et organisation de la pratique) :

0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10

---

Indice Global (additionnez les points entre parenthèses) :