

DEPISTAGE COVID

à la Pharmacie

Test Antigénique

Vous avez réalisé un prélèvement nasopharyngé pour la détection antigénique du virus SARS-CoV-2 (COVID-19)



Synthèse du Test

INFORMATIONS SUR LE PATIENT

Nom : _____ Prénom : _____

N° de sécurité sociale : _____

Code postal : _____ N° de téléphone : _____

INFORMATIONS RELATIVES AU TEST

Pharmacien :

Nom : _____

Prénom : _____

Date et heure du prélèvement :

Matériel utilisé :

Marque et référence : _____

Numéro de lot : _____

Date de péremption : _____

Résultat

Nous vous invitons à adresser ce résultat à votre médecin traitant

POSITIF : Isolez-vous immédiatement, contactez votre médecin pour une prise en charge médicale, et listez les personnes que vous auriez pu contaminer.

NEGATIF : Respectez les gestes barrières.

NB : transmettre un exemplaire au patient et en conserver un exemplaire

Aucune confirmation par RT-PCR n'est nécessaire, quel que soit le résultat

Les Différents Tests Possibles

	Test Sérologique	Test PCR	Test Antigénique
Où est-il disponible ?	Possible en pharmacie	En laboratoire	Possible en pharmacie
Que dépiste-t'il ?	Les anticorps	ARN du virus	Les antigènes
À quoi sert-il ?	Détecter la trace d'une ancienne infection	Détecter la présence active du virus	Détecter la présence active du virus
Quel type de prélèvement ?	Sanguin	Nasopharyngé	Nasopharyngé
La durée minimum du résultat	15 min	24 h	15 min

Que faire à la suite de l'isolement ?

- Si des symptômes apparaissent:

Isolement de 7 jours à partir de l'apparition des symptômes, je consulte mon médecin

- Si je n'ai pas de symptômes:

J'arrête mon isolement mais je fais preuve de vigilance (éviter le contact avec des personnes vulnérables pendant 1 semaine)

Rappel sur les Gestes Barrières

- 1 SE LAVER RÉGULIÈREMENT LES MAINS
- 2 TOUSSER OU ETERNUER DANS SON COUDE
- 3 EVITER LES CONTACTS PHYSIQUES & RESTER À DISTANCE D'UN MÈTRE
- 4 UTILISER UN MOUCHOIRS À USAGE UNIQUE ET LE JETER
- 5 PORTER UN MASQUE
- 6 AÉRER SON LIEU DE VIE

Les conseils pour surveiller sa santé

Repos, prendre la température 2 fois par jour. En cas de fièvre, prendre du paracétamol, continuer les traitements si vous avez une autre maladie (appeler son médecin en cas de doute), Ne pas prendre d'autre traitements sans en parler à un professionnel de santé (pharmacien/médecin)