

ADMINISTRATION DU VACCIN – DE LA PRISE DE RENDEZ-VOUS A LA FACTURATION

Conservation des vaccins



Prise de rendez-vous

1. Pour chaque flacon disponible, prévoir une plage de vaccination de 11 personnes (plus une liste d'attente que vous pourrez appeler en cas de désistement)

Environ 15 minutes avant le 1^{er} rendez-vous :



1. Désinfecter le plan de travail avec une lingette désinfectante.
2. Se désinfecter les mains avec SHA minimum 30 secondes.
3. Vérifier l'intégrité du flacon (pas de particules en suspension, la couleur va d'incolore à légèrement brune)
4. Retirer l'opercule et désinfecter du bouchon du flacon pendant 1 minute avec une compresse imbibée d'alcool à 70°
5. Percer le flacon
6. Prélever la première dose (vérifier que la couleur dans la seringue va de claire à légèrement opaque)
(ATTENTION : prélever un peu plus que 0,5 ml et purger dans le flacon pour ajuster à 0,5ml et ne pas avoir d'air dans la seringue)
7. Recapuchonner l'aiguille et remettre la seringue dans son emballage (qui reste stérile à l'intérieur puisque non touché)
8. Noter le N° de lot, la date et l'heure limite d'utilisation.
9. Répéter l'opération jusqu'à obtention des 10 doses.
10. Entreposer les 10 seringues dans votre réfrigérateur, sur un plateau désinfecté au préalable, identifié avec la date et l'heure de péremption des doses, (Les 10 doses seront périmées au même moment !)



En attente d'information pour les pharmaciens

A chaque patient :

1. Faire s'asseoir le patient (conseil : prévoir un tabouret pour le vaccinateur afin de conserver une bonne posture)
2. Vérifier l'identité du patient
3. Vérifier quel vaccin il a eu pour première injection s'il s'agit de la 2^{ème}
4. Vérifier que le patient n'a pas de contre-indications à l'aide du questionnaire à signer et à conserver (+demander aussi si gaucher ou droitier)
5. Informer le patient des éventuels effets secondaires et lui expliquer qu'il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir si les symptômes suivants apparaissent dans les 24-48h car il s'agit de la réponse immunitaire du corps. (Voir tableau pour effets peu graves)
6. Recueillir le consentement éclairé du patient
7. Récupérer la seringue dans le réfrigérateur
8. Se désinfecter les mains avec SHA minimum 30 secondes.
9. Enfiler les gants
10. Désinfecter la zone d'injection au niveau du deltoïde à l'aide d'une compresse imbibée d'alcool. Frotter en « coquille d'escargot », en commençant par le centre.
11. Rassurer le patient
12. Tendre la peau, injection intramusculaire (enfoncer l'aiguille jusqu'au bout et injecter en une fois) Jeter la seringue sans recapuchonner dans le DASRI et le reste à la poubelle)
13. Retrait des gants
14. Désinfection des mains avec SHA
15. **Pendant la surveillance du patient (15 minutes) :**
16. Facturation
17. Prise de rendez-vous pour 2^{ème} injection si nécessaire
18. Ouvrir le DMP du patient et renseigner la vaccination
19. Renseignement de la plateforme **Vaccin COVID sur espacepro.ameli.fr**
20. **Remettre au patient son attestation de vaccination**

Patients sous anticoagulant équilibrés :

exercer une pression ferme au point d'injection sans masser ni frotter pendant au moins 2 min. informer du risque d'hématome.