MEMOCOVID-19 LA VACCINATION À L'OFFICINE

Contexte

- Dans le cadre du déploiement de la vaccination au niveau de la médecine de ville les pharmaciens ont la possibilité de vacciner leurs patients contre la COVID-19.
- L'importance des officines va augmenter avec l'accroissement de la disponibilité des vaccins.

Vaccins Utilisables par le Pharmacien

Astrazenecca / Janssen:

- Vaccin à vecteur viral
- 10 Doses de 0,5ml (Astrazeneca)
- 5 Doses de 0,5ml (Janssen)

Moderna:

- Vaccin à ARNm
- 10 Doses de 0,5ml

Populations Cibles

Le Pharmacien est autorisé à administrer sans ordonnance les vaccins ci-dessus aux populations suivantes :

Astrazeneca / Janssen

55 Ans et plus

Moderna

18 Ans et plus

Espace de Vaccination

La vaccination contre la COVID 19 peut se faire dans le local de Confidentialité utilisé pour la vaccination antigrippale répondant aux critères suivants :

- Espace clos (confidentialité visuelle & sonore)
- Accessible depuis l'espace client et sans accès possible aux médicaments
- Avec une chaise ou un fauteuil pour installer le patient
- Point d'eau pour le lavage des mains, ou Solution Hydroalcoolique

Opérateurs

Les pharmaciens et les étudiants en pharmacie de deuxième et troisième cycle sont autorisés à vacciner.

Commande

- Sur le Portail dédié : https://declarations-pharmacie.ars.sante.fr
- Déclaration préalable en tant que vaccinateur sur le portail dédié Commande hebdomadaire (avant mercredi soir)
- Nombre de flacons autorisé régulé

Facturation

METROPOLE:

- 7,90 € TTC (TVA 0 %) pour la délivrance de la dose, le questionnement préalable et l'injection du vaccin.
- 5,40 € TTC (TVA 0 %) pour la saisie des informations relatives à l'injection dans le téléservice.



MENOCOVID-19 LA VACCINATION À L'OFFICINE

Enregistrement

- Enregistrement obligatoire sur la plateforme
 Vaccin Covid
- Portail d'authentification e-CPS (esante.gouv.fr)
- Nécessite d'avoir activé sa e-CPS
- Permet la déclaration des effets indésirables
- Permet d'obtenir un bilan imprimable pour le patient

Equipements

- ✓ Aiguille de 23/25G intramusculaire (adaptée à la corpulence du patient)
- ✓ Une seringue de 1 ml
- ✓ Gants
- ✓ Masque de protection
- ✓ Collecteur DASRI
- Enceinte réfrigérée avec un suivi des températures
- ✓ Trousse de première urgence (ANAPEN®)

Conservation			
	Flacon fermé : Entre +2°C et +8°C	Flacon ouvert : Entre +2°C et +8°C	Flacon ouvert : À température ambiante (<+25°C)
Vaxzevria (Astrazeneca)	6 mois	48 heures	6 heures
Janssen (Johnson & Johnson)	3 mois	6 heures	3 heures
Moderna	30 jours	6 heures	6 heures
Cominarty (Pfizer)	30 jours	6 heures	6 heures