

MÉMO COVID-19

PAXLOVID – TRAITEMENT CONTRE LE COVID 19

PRÉSENTATION (Source DGS urgent n° 2022-22)

- 1er médicament antiviral d'accès précoce à être prescrit et dispensé en médecine de ville pour les patients adultes sévèrement immunodéprimés ou présentant une pathologie à très haut risque et pour les patients de + de 65 ans présentant des risques de développer une forme grave de la COVID-19. Ce traitement à visée curative n'a pas vocation à remplacer la vaccination.
- **Uniquement** pour les patients âgés de **18 ans et plus** qui **réunissent en même temps les 3 conditions** suivantes :
 - ✓ TAG ou RT-PCR **positif**
 - ✓ **Pas de besoin d'oxygénothérapie**
 - ✓ Présentent un **risque important d'évoluer vers une forme grave** de la maladie.
- Traitement à **prendre** obligatoirement **au plus tard 5 jours après le début des symptômes**.
- Si le TAG réalisé dans votre officine est positif et que le patient correspond aux facteurs de risques, parlez-lui de ce traitement invitez-le à contacter son médecin traitant

Selon les données disponibles:

↳ **du risque** de progression vers une **forme grave** (hospitalisation ou décès) **d'env. 85,2 %** après son administration.

CONTRÔLE DE L'ÉLIGIBILITÉ / COMMANDE

- **Contrôler le code** barre d'identification unique du patient
- Contrôle d'éligibilité :
 - ✓ Âge **18 ans minimum**
 - ✓ TAG ou RT-PCR **positif**
 - ✓ **Le traitement commence** bien **maximum 5 jours après le début des symptômes**
 - ✓ **Absence de contre-indication** ou **d'interaction majeure** avec un traitement existant (adaptation de posologie des traitements en cours possible)
DANS TOUS LES CAS: CONSULTER LA NOTICE!
 - Inscription sur la plateforme avec CPS du titulaire ou du gérant: www.ap-paxlovid.com
 - Saisir le n° d'identification unique attribué au patient (indiqué sur l'ordonnance)
 - Scanner le code barre imprimé sur l'ordonnance.
 - Tutoriel de connexion permettant la création du compte : https://www.ap-paxlovid.com/pdf/Pas%20%C3%A0%20pas_Saisie_Pharmacien.pdf
 - **Commander sur la plateforme** <https://www.ap-paxlovid.com/>
Livraisons uniquement du lundi au samedi (non férié)
 - Si commande avant 11h : livraison dans la journée.
 - Si commande avant 18h : livraison le lendemain matin.
 - Décommissionnement assuré par le dépositaire.

Patients non éligibles si:

- Hospitalisés pour COVID ou pouvant être hospitalisés dans les 24h.
- Symptômes de COVID sévères (dyspnée au repos ou détresse respiratoire nécessitant une oxygénothérapie.
- Patients pas en capacité de recevoir le Paxlovid dans les 5 jours suivant les 1^{ers} symptômes.
- Hypersensibilité connue à l'un des constituants
- Traitement concomitant avec médicament dont le métabolisme dépend fortement du CYP3A
- Traitement concomitant avec des médicaments qui sont de puissants inducteurs du CYP3A, la co-administration pouvant entraîner des concentrations plasmatiques significativement réduites de PF 07321332/ritonavir avec un risque de perte de réponse virologique et de résistance potentielle
- Patients suivant un essai clinique

CONTRÔLE À RÉCEPTION

- **Repérer le n° d'identification** du patient (étiquette sur le colis)
- **Inscrire ce n° sur la boîte** de médicament
- **Informé le patient de l'arrivée** de son traitement
- **Scanner le code barre de l'ordonnance** ou du bordereau de commande

CONSERVATION


Température ambiante (max 25°C)
NE PAS CONGELER
NE PAS STOCKER AU RÉFRIGÉRATEUR

MÉMO COVID-19

PAXLOVID – TRAITEMENT CONTRE LE COVID 19

DISPENSATION

- Vérifier que le délai maximum de 5j suivant l'apparition des symptômes est bien respecté
- Informer le patient (notice)
 - ✓ Lui dire de débiter le traitement le plus rapidement possible
 - ✓ Lui rappeler l'importance de respecter strictement la posologie
 - ✓ En cas d'effet indésirable ou situation particulière comme une grossesse par exemple : déclarer sur www.signalement-sante.gouv.fr
 - ✓ Scanner le code barre et renseigner date de délivrance et n° de lot
- En cas de non-délivrance du traitement:
 - ✓ L'indiquer sur la fiche patient,
 - ✓ Garder la boîte dans les conditions définies pour un autre patient
 - ✓ Reporter le numéro d'identification sur la fiche du 2nd patient.
 - ✓ Au besoin : Santé Publique France peut récupérer la boîte



FACTURATION (TARIFS MÉTROPOLE)

RÉMUNÉRATION MÉTROPOLE	Prix HT	Prix TTC
Dispensation	9,03 €	9,22 €
Honoraire à la boîte	1,00 €	1,02 €
Honoraire de dispensation	0,50 €	0,52 €
+ Honoraire lié à l'âge (>70 ans)	1,50 €	1,58 €

Calcul rémunération :

18-69 ans :

$$9,03 + 1,00 + 0,50 = 10,53 \text{ € HT} \\ (10,75 \text{ € TTC})$$

Plus de 70ans :

$$9,03 + 1,00 + 0,50 + 1,50 = 12,03 \text{ € HT} \\ (12,28 \text{ € TTC})$$

Code CIP :

34009
3024551 4
Prise en charge 65 %

POSOLOGIE & MODE D'ADMINISTRATION :

- 300 mg de PF-07321332 (2 comprimés roses + 100 mg de ritonavir (1 comprimé blanc))
- Par voie orale toutes les 12h pendant 5j.
- Les comprimés doivent être pris ensemble, avec ou sans nourriture.
- Ils doivent être avalés entiers sans être coupés, mâchés ou écrasés.

Recommandations HAS : https://www.has-sante.fr/jcms/p_3311133/fr/paxlovid-pf-07321332/ritonavir

ANSM : <https://ansm.sante.fr/tableau-atu-rtu/paxlovid-150-mg-100-mg-comprimes-pellicule>

N° d'appel pour toute question :

0 805 987 949 Service & appel gratuits

PRÉCAUTIONS D'USAGE :

INSUFFISANCE RÉNALE :

Légère : pas d'adaptation de la posologie

Modérée : 150 mg de PF-07321332 (1 comprimé rose) + 100 mg de ritonavir (1 comprimé blanc)

Sévère : PAS D'ADMINISTRATION

INSUFFISANCE HÉPATIQUE :

Légère ou modérée : pas d'adaptation de la posologie

Sévère : PAS D'ADMINISTRATION

Femmes enceintes ou en âge de procréer n'utilisant pas de moyen de contraception: **NON RECOMMANDÉ** (contraception hormonale : à combiner avec autre moyen (notamment préservatif) car le traitement peut baisser l'efficacité du contraceptif hormonal)

Interrompre l'allaitement pendant la durée du traitement et pendant 7j après l'arrêt du traitement.